

Conociendo el cáncer de ovario

El cáncer de ovario es uno de los más comunes en las mujeres.

Provoca más muertes que cualquier otro cáncer del aparato reproductor femenino, la causa es aún desconocida.

Se origina en los ovarios encargados de producir los óvulos para la reproducción, y también son la fuente principal de las hormonas femeninas: estrógeno y progesterona.

El riesgo de una mujer de padecer cáncer ovárico durante su vida es de aproximadamente 1 en 75 y la probabilidad de morir por este tipo de cáncer es de 1 en 100 aproximadamente.

Factores de riesgo:

- ▶ Pocos partos y en edad tardía.
- ▶ Antecedentes familiares y/o personales de cáncer de mama o de ovarios.
- ▶ Edad: aproximadamente el 50% de las mujeres diagnosticadas con cáncer de ovario tienen 63 años o más.
- ▶ Es más común en mujeres blancas.

Los síntomas de este tipo de cáncer son vagos; por esta razón, cuando se diagnostica, el tumor a menudo se ha diseminado más allá de los ovarios. Estos pueden incluir:

- ▶ Distensión o hinchazón del área abdominal.
- ▶ Dificultad para comer o sentirse llena rápidamente.
- ▶ Dolor pélvico o abdominal bajo.
- ▶ Sangrado vaginal entre periodos.
- ▶ Pérdida o aumento de peso.



- ▶ Crecimiento excesivo del vello áspero y oscuro.
- ▶ Necesidad de orinar con más frecuencia de lo normal.

Otros síntomas comunes en mujeres que no necesariamente tienen cáncer, pero que requieren de atención oportuna:

- ▶ Ciclos menstruales anormales.
- ▶ Síntomas digestivos: estreñimiento, indigestión, náusea, vómito, etc.
- ▶ Dolor de espalda por razones desconocidas.

Recuerda siempre que ante cualquier anomalía o síntoma, debes consultar a tu médico para un diagnóstico oportuno.

Esta página no exime por ningún motivo la consulta al médico.
Este es un servicio cortesía de Grünenthal.

Referencias:

1. Rivas-Corchado, et al; Perfil epidemiológico del cáncer de ovario; Ginecol Obstet Mexico, 79 (9):558-584, 2011
2. Espinosa E, Zamora P; Cáncer de ovario; Medicine 8(57): 3058-3063, 2001