

Dispareunia

La dispareunia es un término médico que simplemente significa coito doloroso.

Es un término general utilizado para describir todos los tipos de dolor sexual.

El dolor sexual puede ocurrir al penetrar, durante el coito y/o después del coito. Puede suceder en cualquier parte del área genital: el clítoris, los labios o la vagina, etc. El dolor puede ser descrito como agudo, como picazón, como un golpe, cólicos o descrito de otras maneras.

Las causas son muy variadas, dentro de las principales se encuentran:

- ▶ Infecciones vaginales o resequedad vaginal
- ▶ Lubricación insuficiente ya sea por falta de excitación o a causa de medicamentos (antihistamínicos)
- ▶ Endometriosis (problema con el tejido de revestimiento del útero)
- ▶ Vaginitis (Inflamación en la vagina)
- ▶ Cistitis (Infección en la vías urinarias inferiores)
- ▶ Retroversión del útero
- ▶ Colitis crónica
- ▶ Menopausia
- ▶ Herpes genital
- ▶ Hemorroides
- ▶ Infecciones del tracto urinario (ITU)
- ▶ Úlceras herpéticas, verrugas genitales u otras infecciones de transmisión sexual.
- ▶ Alergia al látex del condón
- ▶ Relaciones sexuales demasiado pronto después de una cirugía o parto



Esta disfunción presenta su síntoma de la siguiente forma:

Hay dolor durante y/o después del coito, este dolor puede ser ardoroso y causar picazón. Se puede sentir en: la vagina, uretra y vejiga. Este dolor también puede aparecer con el uso de tampones.

Las opciones de tratamiento de la dispareunia pueden variar, dependiendo de la causa subyacente del dolor.

No olvides consultar a tu médico ante cualquier molestia y sigue sus recomendaciones.

Esta página no exime por ningún motivo la consulta al médico. Este es un servicio cortesía de Grünenthal.